


症例3

24年間に上顎全部に骨造成したケース

第1段階

初診:H.4.1.25
患者:当時 45歳・男性
主訴:⑦⑥⑤ Brの動揺




H.4.2.26埋入



第2段階 3年9か月経過

③21 | 12③ 前歯ブリッジ破損



H.7.11.27 埋入



H.10.8.17 76 の動揺を主訴に来院

H.11.2.13 76 抜歯

H.11.8.20 埋入



第3段階 13年経過

H.17.3.23に右上のインプラントの動揺が主訴で来院



埋入後13年でネック部でのヘッド折れにて撤去



撤去したブレードインプラント




ダメージの大きな撤去痕



H.18.7.27 14年6か月経過

右上のリカバリー終了時のレントゲン写真



右上リカバリー終了時のインプラントの状態

ヘッドを立てた状態


上部構造が入った咬み合わせの状態



第4段階 17年6か月経過

H21.7.13

前歯のブリッジと左上のブリッジが動揺して来院



14年6か月後前歯のインプラント撤去



除去後10日目の口腔内




H22.5.1 上顎骨造成完了



左側臼歯部は十分な骨量が確保出来た

H22.6.5 埋入



H.22.12.25 リカバリー完了。現在も順調に機能しています

